



## Perenteryl® Cápsulas 250 mg

*Saccharomyces boulardii* CNCM I-745®

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene alguna duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

### COMPOSICION Y PRESENTACION:

**Perenteryl®** Cápsulas 250 mg

Cada cápsula contiene:

*Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 250 mg

Excipientes c.s.

**Excipientes:** Lactosa monohidrato, Estearato de magnesio, Dióxido de titanio, gelatina.

### INDICACION:

Está indicado para el tratamiento de las diarreas inespecíficas, como complemento de la rehidratación y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos, producidos por la administración de antibióticos.

**CLASIFICACION:** Microorganismos Antidiarreicos.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a *Saccharomyces boulardii* y/o a cualquiera de sus componentes. Hipersensibilidad a levaduras.

### ADVERTENCIAS y Precauciones:

El uso de este medicamento en pacientes críticos inmunosuprimidos debe realizarse sólo bajo supervisión médica. Usted debe consultar inmediatamente a su médico en los siguientes casos:

- En ausencia de mejoría después de 2 / 3 días de tratamiento;
- En caso de fiebre, vómitos;
- En caso de presencia de sangre o mucosa en las deposiciones.

### INTERACCIONES:

No debe administrarse conjuntamente con tratamientos antifúngicos orales o sistémicos debido a que esto puede disminuir el efecto de *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745.

El uso simultáneo con inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO) tales como Selegilina, Rasagilina y Moclobemida, puede causar aumento de la presión arterial. Los IMAO se utilizan principalmente como antidepresivos y como antiparkinsonianos. No debe mezclarse con bebidas o alimentos muy calientes (superior a 50° C o muy frías o que contengan alcohol ya que *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 son células vivas.

### EFFECTOS INDESEABLES:

Raramente puede provocar flatulencia.

Reacciones adversas menos frecuentes son reacción anafiláctica. Prurito, urticaria, erupción cutánea, y angioedema y dificultad para respirar. Se han reportado casos de fungemia por *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 en pacientes con deficiencias inmunitarias severas o por su manipulación cerca de pacientes con catéter venoso central

### DOSIS Y MODO DE USO:

La dosis usual recomendada es:

**Adultos y niños mayores de 12 años:** 1 cápsula cada 12 horas.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original protegido del calor, la luz y la humedad, a no más de 30°C. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. No repita el tratamiento sin indicación médica. No recomiende este medicamento a otra persona.

Importado por:

Axon Pharma SpA, Cerro El Plomo N° 5420, Of 1403.

Las Condes, Santiago, Chile.

Fabricado por:

Biocodex, 1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, Francia.

Distribuido por:

Novofarma Service S.A., Víctor Uribe N° 2280. Quilicura, Santiago, Chile y/o Aconfar Chile Ltda, Av. Américo Vespucio N° 1385, Módulo 48, Quilicura, Santiago, Chile

® = Marca Registrada