

## FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE



### Perenteryl® Pediátrico Polvo liofilizado para uso oral 250 mg

*Saccharomyces boulardii*

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene alguna duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

#### COMPOSICION Y PRESENTACION:

### Perenteryl® Pediátrico

Polvo liofilizado para uso oral 250 mg

Cada sobre contiene: *Saccharomyces boulardii* liofilizado 250 mg

Excipientes c.s.

**Excipientes:** lactosa, D (-) fructosa (levulosa), dióxido de silicio coloidal, aroma tutti-frutti artificial.

**INDICACION:** Está indicado para el tratamiento sintomático de las diarreas agudas inespecíficas, como complemento de la rehidratación, y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos.

#### USOS:

Para el tratamiento y prevención de: gastroenteritis, colitis y enterocolitis.

Diarreas agudas y crónicas.

Diarreas inespecíficas y estacionales.

Diarreas infecciosas bacterianas o virales.

Diarreas post-antibioticoterapia.

#### CLASIFICACION:

Antidiarreico.

#### DOSIS Y MODO DE USO:

La dosis usual en adultos y niños mayores de 2 años es de 250 mg cada 12 horas.

Vía de administración: oral

Para su administración se mezcla el contenido del sobre con un poco de agua, o con alimentos o el biberón evitando una temperatura muy alta, o bien, ingerir directamente del sobre, gracias a su agradable sabor. La dosis de *Saccharomyces boulardii* puede aumentarse sin peligros, ya que no presenta riesgos de toxicidad.

También puede administrarse conjuntamente con antibióticos sin alterar su actividad.

#### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a *Saccharomyces boulardii* o a cualquiera de los componentes de la formulación.

Hipersensibilidad a levaduras.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

El uso de este medicamento en pacientes críticos o inmunodeprimidos debe realizarse solo bajo supervisión médica. Consulte con su médico si la diarrea dura más de 2 días, si aparece sangre en las deposiciones o si presenta fiebre.

El uso de este medicamento no reemplaza la necesidad de rehidratación que puede resultar de cuadros de diarrea. Este medicamento no debe ser administrado con antifúngicos, líquidos muy calientes o muy fríos, ya que pueden disminuir su efectividad.

Las cápsulas y los sobres no deben abrirse en la cercanía de pacientes con catéter venoso central o en diálisis peritoneal.

Debe evitar el consumo de alcohol mientras esté utilizando este medicamento, ya que puede aumentar el riesgo de deshidratación.

Consulte con su médico ante cualquier síntoma de reacciones alérgicas, tales como alteraciones a la piel y dificultad para respirar.

## INTERACCIONES:

No debe administrarse junto con antifúngicos, debido a que esto puede disminuir el efecto de *Saccharomyces boulardii*. El uso simultáneo con inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO), tales como selegilina, rasagilina y moclobemida, puede causar aumento de la presión arterial. Los IMAO se utilizan principalmente como antidepresivos y como antiparkinsonianos.

## REACCIONES ADVERSAS:

Como todos los medicamentos, Perenteryl Pediátrico Polvo Liofilizado para uso oral 250 mg, puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Raramente puede provocar flatulencia. Reacciones adversas menos frecuentes son reacción anafiláctica, prurito, urticaria, erupción cutánea, exantema local o generalizado, angioedema y dificultad para respirar. Se ha señalado que podrían producirse casos con fungemia por el uso de *Saccharomyces boulardii* en pacientes con deficiencias inmunitarias severas o por su manipulación cerca de pacientes con catéter venoso central.

Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si nota cualquier efecto adverso no mencionado en este folleto, informe a su médico o farmacéutico.

## SOBREDOSIFICACIÓN:

No se han descrito casos de intoxicación aguda por *Saccharomyces boulardii*. La recomendación general para estos casos de sobredosificación es ingerir abundante líquido y recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación, llevando el envase del medicamento.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños.

Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad, a no más de 30°C.

**No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.**

**No repita el tratamiento sin indicación médica.**

**No recomiende este medicamento a otra persona.**

® = Marca Registrada

**Fabricado por Laboratoires Biocodex,**

1 Avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, Francia.

**Importado y comercializado por Axon Pharma SPA.**

Cerro El Plomo 5420, Of. 1403, Las Condes, Santiago, Chile.

Distribuido por Novofarma Service S.A.

Victor Uribe 2280, Quilicura, Santiago, Chile.

**Mayor información en [www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)**